

## SERIA 8

**Twierdzenie** (Kryterium Dirichleta). Załóżmy, że funkcje  $f_n, g_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  spełniają następujące warunki:

- (1) dla dowolnego  $x \in X$  ciąg  $(f_n(x))$  jest monotoniczny,
- (2) ciąg  $(f_n(x))$  jest jednostajnie zbieżny do zera na zbiorze  $X$ ,
- (3) ciąg sum częściowych szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$  jest jednostajnie ograniczony na  $X$ .

Wtedy szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$  jest jednostajnie zbieżny na zbiorze  $X$ .

**Twierdzenie** (Kryterium Abela). Załóżmy, że funkcje  $f_n, g_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , spełniają następujące warunki:

- (1) dla dowolnego  $x \in X$  ciąg  $(f_n(x))$  jest monotoniczny,
- (2) ciąg  $(f_n(x))$  jest jednostajnie ograniczony na  $X$ ,
- (3) szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$  jest jednostajnie zbieżny na  $X$ .

Wtedy szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$  jest jednostajnie zbieżny na zbiorze  $X$ .

**Zadanie 1.** Wykazać, że szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin(n^2 x)}{n^2}$  jest zbieżny na  $\mathbb{R}$  i jego sumą jest funkcją ciągłą na  $\mathbb{R}$ . Zbadać zbieżność jednostajną tego szeregu.

**Zadanie 2.** Udowodnić zbieżność jednostajną na zbiorze  $X$  następujących szeregów:

- (a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ ,  $X = [\delta, 2\pi - \delta]$ ,  $0 < \delta < \pi$ ,
- (b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 x) \sin(nx)}{n+x^2}$ ,  $X = \mathbb{R}$ ,
- (c)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^x}$ ,  $X = [a, \infty)$ ,  $a > 0$ ,
- (d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+x^2} \arctg(nx)$ ,  $X = \mathbb{R}$ .